



## Zasady selekcji w okręgu toruńskim

1. Łoś – bez zmian
2. Jeleń szlachetny

Rodzaj odstrzału	Rok życia (poroże)	Odstrzał		
		prawidłowy (0)	nieprawidłowy (X)	Rażąco nieprawidłowy (XX)
		opis formy poroża		
selekcyjny – do 80% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	2 (I)	szpicaki o średniej długości tyk do 30 cm	szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm	szpicaki rozwidlone, koronne i formy wyższe
	3 (II)	do ósmaka nieregularnego włącznie	ósmaki regularne	formy wyższe
	4-5 (3-4)	wszystkie formy niekoronne	dziesiątaki jednostronnie koronne	formy wyższe
	6-10 (5-9)	wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne	dziesiątaki obustronnie koronne	formy wyższe
łowny – około 20% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	10 i starsze	bez względu na formę poroża	brak	

\* w trakcie oceny prawidłowości odstrzału selekcyjnego za odnogę jest uznawany odrost o długości minimum:

- 2 cm w 2. roku życia,

- 5 cm u osobników w 3. roku życia i starszych,

\*\* zaleca się odstrzał byków łownych po 20 września,

\*\*\* udział osobników łownych w pozyskaniu może być większy od zalecanego, jeśli umożliwiła struktura populacji w rejonie hodowlanym np. licznie zasiedlonym przez duże drapieżniki

### 3. Daniel zwyczajny

Rodzaj odstrzału	Rok życia (poroże)	Odstrzał		
		prawidłowy (0)	nieprawidłowy (X)	rażąco nieprawidłowy (XX)
		opis formy poroża		
Selekcyjny – do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	2 (1)	szpicaki o śr. długości tyk do 15 cm (około wysokości łyżek)*	szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm	brak
	3 (2)	łyżkarze o średniej długości tyk do 40 cm	łyżkarze o średniej długości tyk powyżej 40 cm i półłopatacze*	formy wyższe
	4-7 (3-6)	wszystkie formy poniżej obustronnego łopatacza, albo z łopatą krótką lub wąską, bądź z głęboką zatoką rozcinającą płaszczyznę łopaty do 1/2 długości lub szerokości (nie dotyczy zatoki nad ostrogą)	obustronne łopatacze bez cech selekcyjnych	poroża bez cech selekcyjnych wycenione na medal
łowny – min. 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	8 i starsze (>=7)	bez względu na formę poroża	brak	

\* zaleca się wykonywanie odstrzału byków z grubymi moździeniami u nasady poroża, bez względu na długość tyk

\*\* łopaty krótkie to takie, których długość nie przekracza 1/3 długości poroża, a wąskie to mające szerokość poniżej 8 cm w środkowej części łopaty,

\*\*\* zaleca się odstrzał byków łownych po 20 października

#### 4. Sarna

Rodzaj odstrzału	Rok życia (poroże)	Odstrzał		
		prawidłowy (0)	nieprawidłowy (X)	rażąco nieprawidłowy(XX)
		opis formy poroża		
Selekcyjny – min 70% ogólnej liczby rogaczy planowanych do odstrzału	2 (1)	szpicaki**	do widłaka regularnego włącznie	formy wyższe
	3-5 (2-4)	do szóstaka nieregularnego włącznie	szóstak regularny i formy wyższe	poroża bez cech selekcyjnych wycenione na medal.
łowny – min. 30% ogólnej liczby rogaczy zaplanowanych do odstrzału	6 i starsze (>=5)	bez względu na formę poroża	brak	

\* w trakcie oceny prawidłowości odstrzału selekcyjnego za odnogę jest uznawany odrost w długości minimum:

- 2 cm w 2. roku życia

- 3 cm u osobników w 3. roku życia i starszych,

\*\* zaleca się oszczędzanie szpicaków z odrostami o charakterze odnogi i długości 1-2 cm

\*\*\* zaleca się odstrzał rogaczy łownych po 20 lipca

#### 5. Muflon – bez zmian